

ESERCIZI DI TEORIA DEI NUMERI

A. BERNARDI

QUINTO FOGLIO DI ESERCIZI

Esercizio 1. Mostrare che un anello principale è di Dedekind. Dare un esempio di un UFD che non sia di Dedekind.

Esercizio 2. Se $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, sappiamo che $\mathcal{O}_K = \{a + b\sqrt{-5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Siano $I = (2, 1 + \sqrt{-5})$, $J = (3, 1 + \sqrt{-5})$, $H = (3, 1 - \sqrt{-5})$.

- (1) Mostrare che I è massimale. Determinare una base intera di I . Mostrare che J, H sono massimali e $J \neq H$.
- (2) Mostrare che $(2) = I^2$, $(3) = JH$, $IJ = (1 + \sqrt{-5})$, $IH = (1 - \sqrt{-5})$.
- (3) In \mathcal{O}_K si hanno due fattorizzazioni distinte di 6: $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$.
- (4) La fattorizzazione in ideali primi di (6) è $(6) = I^2 JH$. Quindi le due fattorizzazioni di 6 si possono vedere raggruppando in due modi possibili i diversi fattori: $(6) = (2)(3) = (I^2)(JH)$ o $(6) = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = (IJ)(IH)$.

Esercizio 3. Sia $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ e $I = (2, 1 + \sqrt{-5}) \subset \mathcal{O}_K$. Determinare d_I e $N(I)$ e concludere che I è primo.

Esercizio 4. Mostrare che la norma di un ideale proprio $I \subset \mathcal{O}_K$, con K campo di numeri, è strettamente maggiore di 1.

Esercizio 5. Mostrare che esistono infiniti convergenti distinti.

Esercizio 6. Mostrare che le radici dell'unità in un campo quadratico reale K sono solo $\{\pm 1\}$.

Esercizio 7. Determinare l'unità fondamentale di $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ ($d > 0$) per $d = 3, 5, 6, 7$.

Esercizio 8. Scopo di questo esercizio è determinare tutti gli interi n tali che lo sviluppo in frazioni continue di \sqrt{n} abbia lunghezza del periodo $h \leq 2$:

- (1) $\sqrt{n} = (a_0; \overline{2a_0})$ se e solo se $n = a^2 + 1$ (caso $h = 1$);
- (2) $\sqrt{n} = (a_0; \overline{a_1, 2a_0})$ se e solo se $n = a^2 r^2 + a$ con $a > 1$ o $n = t^2 a^2 + 2t$ (caso $h = 2$).

Sia (u, v) la soluzione fondamentale dell'equazione $x^2 - dy^2 = 1$ con $d = a^2 r^2 + a$. Mostrare che, in dipendenza da a e da r , può succedere sia che $u > d$ sia che $u < d$.

Esercizio 9. Mostrare che nonostante -1 sia un quadrato modulo 34, l'equazione anti-Pelliana $x^2 - 34y^2 = -1$ non ha soluzioni intere.